



## Lo que debe saber sobre las vacunas contra el COVID-19 para niños menores de 5 años

### LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19 ESTÁN AQUÍ

para niños mayores  
de 6 meses.



### PROTEJA A SU HIJO

contra las enfermedades  
graves causadas por el  
COVID-19.


Los médicos quieren que sepa que  
**LAS VACUNAS CONTRA EL  
COVID-19 TAMBIÉN SON  
SEGURAS PARA LOS NIÑOS.**

Se ha vacunado a millones de niños y EE. UU. continúa controlando la seguridad.



### EVITE QUE SU HIJO PROPAGUE EL VIRUS

COVID-19.



### MENOS PREOCUPACIÓN Y MÁS DIVERSIÓN

Las vacunas contra el COVID-19  
ayudarán a que los niños sigan  
yendo a la guardería, la escuela  
y las actividades grupales.



Para inscribirse para un turno para vacunarse, visite  
**[www.dupagehealth.org/covid19vaccine](http://www.dupagehealth.org/covid19vaccine).**

Después de inscribirse, recibirá información adicional por correo  
electrónico sobre la programación de un turno.



Encuentre otros proveedores de atención médica cercanos que  
vacunen contra el COVID-19 en [www.vaccines.gov](http://www.vaccines.gov).



## Los niños y las vacunas contra el COVID-19 Recomendaciones por grupo etario

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses se vacunen contra el COVID-19. La vacunación es la mejor forma de proteger a nuestros niños, amigos y familiares del COVID-19.

Los ensayos clínicos sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas de Pfizer y Moderna en estos grupos etarios indican la dosis y serie autorizadas para niños.

Grupo etario	Serie ¿Cuántas vacunas y cuándo?	Dosis Comparada con la dosis para adultos	Dosis de refuerzo ¿Se recomiendan vacunas de refuerzo?
<b>Pfizer</b>			
De 6 meses a 4 años	Serie de 3 vacunas: 2 dosis, con 3-8 semanas de diferencia, seguidas de una 3.ª dosis al menos 2 meses después	Un décimo	No en este momento
De 5 a 11 años	Serie de 2 vacunas: 2 dosis, con 3-8 semanas de diferencia	Un tercio	Sí, al menos 5 meses después de la segunda dosis
De 12 a 17 años	Serie de 2 vacunas: 2 dosis, con 3-8 semanas de diferencia	La misma	Sí, al menos 5 meses después de la segunda dosis
<b>Moderna</b>			
De 6 meses a 5 años	Serie de 2 vacunas: 2 dosis, con 4-8 semanas de diferencia	Un cuarto	No en este momento
De 6 a 11 años	Serie de 2 vacunas: 2 dosis, con 4-8 semanas de diferencia	La mitad	No en este momento
De 12 a 17 años	Serie de 2 vacunas: 2 dosis, con 4-8 semanas de diferencia	La misma	No en este momento

Puede ver las recomendaciones específicas sobre la vacuna contra el COVID-19 para personas moderada o gravemente inmunodeprimidas en: [www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html)



Las recomendaciones son de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del 18 de junio de 2022. Para acceder a la información y los consejos de vacunación más actualizados, visite [CDC.gov/coronavirus](https://www.cdc.gov/coronavirus).

\* Contenido adaptado de "Children and COVID-19 Vaccine - Recommendations by Age Group" (Los niños y la vacuna contra el COVID-19 - Recomendaciones por grupo etario), Public Health Communications Collaborative, 20 de junio de 2022