



Co należy wiedzieć o szczepionkach przeciw COVID-19 dla dzieci poniżej 5. roku życia?

DOSTĘPNE SĄ TU SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19

dla dzieci w
wieku 6 miesięcy
i starszych.



CHROŃ SWOJE DZIECKO

przed ciężkimi
objawami COVID-19.

Lekarze zapewniają, że


SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 SĄ BEZPIECZNE TAKŻE DLA DZIECI!

Zaszczepiono miliony dzieci, a Stany Zjednoczone kontynuują monitorowanie bezpieczeństwa.



OCHROŃ DZIECKO PRZED ZAKAŻENIEM

COVID-19



MNIEJ ZMARTWIEN, WIĘCEJ ZABAWY

Szczepionki przeciw COVID-19 sprawiają, że dziecko nieprzerwanie uczestniczy w zajęciach przedszkolnych, szkolnych i grupowych.



Aby zapisać się na szczepienie, odwiedź stronę

www.dupagehealth.org/covid19vaccine.

Po rejestracji skontaktujemy się z Tobą drogą e-mailową ze szczegółami zaplanowanej wizyty.

**OUR
SHOT
DUPAGE**

Informacje dotyczące innych świadczeniodawców oferujących szczepienia przeciw COVID-19 w Twojej okolicy znajdują się na stronie www.vaccines.gov.



Zalecenia dotyczące szczepienia dzieci przeciw COVID-19 według grupy wiekowej

CDC zaleca podanie szczepionki przeciw COVID-19 każdemu dziecku w wieku 6. miesięcy i starszemu. Szczepienia to najlepszy sposób na ochronę dzieci, przyjaciół i członków rodziny przed COVID-19.

Dawka i seria przeznaczona dla dzieci została ustalona na podstawie wyników badań klinicznych nad skutecznością i efektywnością szczepionek Pfizer i Moderna w tych grupach wiekowych.

Grupa wiekowa	Seria Ile dawek i kiedy?	Dawka W porównaniu do dawki dla osoby dorosłej	Dawka przypominająca Czy zalecana jest dawka przypominająca?
Pfizer			
6 miesięcy – 4 lata	Seria 3 dawek: 2 dawki podawane w odstępie 3–8 tygodni, następnie 3. dawka po upływie co najmniej 2 miesięcy	1/10	Nie w tym czasie
5 – 11 lat	Seria 2 dawek: 2 dawki podawane w odstępie 3–8 tygodni	1/3	Tak, przynajmniej 5 miesięcy po podaniu drugiej dawki
12 – 17 lat	Seria 2 dawek: 2 dawki podawane w odstępie 3–8 tygodni	Równa	Tak, przynajmniej 5 miesięcy po podaniu drugiej dawki
Moderna			
6 miesięcy – 5 lat	Seria 2 dawek: 2 dawki podawane w odstępie 4–8 tygodni	1/4	Nie w tym czasie
6 – 11 lat	Seria 2 dawek: 2 dawki podawane w odstępie 4–8 tygodni	1/2	Nie w tym czasie
12 – 17 lat	Seria 2 dawek: 2 dawki podawane w odstępie 4–8 tygodni	Równa	Nie w tym czasie

Szczegółowe zalecenia dotyczące szczepienia przeciw COVID-19 u osób z umiarkowanie lub poważnie obniżoną odpornością są dostępne na stronie: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html



Zalecenia Centrów Prewencji i Kontroli Chorób są obowiązkowe w dniu 18 czerwca 2022 r. Aby uzyskać najnowsze informacje i porady dotyczące szczepień, odwiedź stronę [CDC.gov/coronavirus](https://www.cdc.gov/coronavirus).

* Treść pochodzi z tekstu Public Health Communications Collaborative z dnia 20 czerwca 2022 r. – „Szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci – zalecenia według grupy wiekowej”.